



Bollettino n° LVII anno 2002

Endemismi italiani - 45 A. Biscaccianti *Parmena subpubescens* Hellrigl, 1971 (Coleoptera, Cerambycidae)... I-II

Cassola F. Questa nostra passione...p.II

Penati F. - New records of *Saprinus lautus* from central Italy (Coleoptera, Histeridae)...p.1

Un maschio di *Saprinus (Saprinus) lautus* Erichson, 1839 è stato catturato nel Parco Naturale dei Monti Lucretili (Lazio, provincia di Roma), mentre un altro esemplare, di sesso indeterminato, è stato catturato sui Monti Sibillini (Marche, provincia di Macerata). Si tratta della prima segnalazione di questa rara specie Centroasiatico-Europea per il Lazio e per le Marche rispettivamente, nonché della terza e quarta per l'Italia, dove sembra essere presente solo sugli Appennini centro-meridionali, in ambienti collinari-montani tra 400 e 1500 m sul livello del mare.

Liberto A. e G. Nardi - Note su *Ipelates latissimus* (Coleoptera, Agyrtidae)...p.5

Gli autori forniscono nuovi reperti di *Ipelates latissimus* (Reitter, 1884), recentemente effettuati in quattro località del Peloponneso sempre su cespugli fioriti di *Crataegus* sp. Le scarse informazioni sulla geonemia e sull'ecologia, sinora pressoché sconosciuta, della specie sono sintetizzate e discusse, è inoltre figurato l'habitus dell'adulto, e, per la prima volta, l'edeago.

Izzillo F., A. Liberto, D. Baiocchi e P. Crovato - *Buprestis humeralis* nuovo per l'Italia ed altri interessanti reperti di Buprestidi dalle regioni centro meridionali e Sardegna (Coleoptera, Buprestidae)...p.11

Vengono resi noti reperti faunistici relativi a 34 specie di Buprestidi italiani. *Buprestis humeralis* Klug, 1829, viene segnalato per la prima volta nel nostro Paese, con distribuzione transionica limitata finora alle pinete costiere del litorale tarantino e materano. Varie altre specie vengono segnalate per la prima volta per il territorio del Parco Nazionale del Pollino (Basilicata-Calabria), mentre altre risultano nuove per alcune regioni italiane centro meridionali. Completano il lavoro alcuni reperti di Buprestidi dalla Sardegna, relativi a specie molto rare od altrimenti interessanti, di cui la distribuzione nell'isola era poco conosciuta e spesso nota solo su antichi reperti.

Gobbi G. - Su alcuni interessanti Coleotteri xilofagi dell'Appennino centrale (Coleoptera: Buprestidae, Cerambycidae)...p.27

Vengono segnalati nuovi reperti italiani di quattro specie di Coleotteri xilofagi, *Agrilus ribesi* Schaefer, 1946

(Buprestidae), *Asemum tenuicorne* Kraatz, 1879, *Stenostola dubia* (Laicharting, 1784) e *Phytoecia coerulea* (Scopoli, 1772) (Cerambycidae), relativi all'Appennino centrale. In particolare, il primo era noto per l'Italia soltanto in base a una vecchia citazione, mai confermata, per il Piemonte; il secondo è stato segnalato in Italia soltanto negli ultimi anni, nell'Appennino settentrionale (Romagna) e meridionale (Campania).

Nardi G. - Note su alcune specie di *Stagetus* (Coleoptera, Anobiidae)...p.33

La distribuzione e l'ecologia in Italia di *Stagetus andalusiacus cribricollis* (Aubé, 1861), *S. elongatus* (Mulsant & Rey, 1861) e *S. byrrhoides* (Mulsant & Rey, 1861) sono esaminate criticamente. *S. elongatus* e *S. byrrhoides* sono segnalati per la prima volta rispettivamente del Lazio e dell'Italia centrale (Lazio). Le segnalazioni di *S. pilula* (Aubé, 1861) per il Lazio sono erronee e devo essere riferite a *S. byrrhoides*. Sono infine discusse due misconosciute antiche segnalazioni di *Dorcatoma punctulata* Mulsant & Rey, 1864 per il Piemonte e la Lombardia.

Gobbi G. - Breve nota sui Ripiforidi romani (Coleoptera, Rhipiphoridae)...p.43

Vengono segnalate tre specie di Coleoptera Rhipiphoridae raccolte negli anni '60 del secolo scorso nell'attuale area urbana di Roma. Una delle tre, *Ptilophorus dufouri*, era segnalata per il Lazio di una sola località.

Nardi G. - Note on *Anthicus melanocephalus* Bonelli (Coleoptera, Anthicidae)...p.45

Anthicus melanocephalus Bonelli, 1812 è considerato **nomen dubium**. Esso è probabilmente identico a *Microhoria (Immicrohoria) fasciata* ssp. *fasciata* (Chevrolat, 1834) (Anthicinae, Microhorini), e non è sicuramente un sinonimo di *Endomia tenuicollis* ssp. *tenuicollis* (Rossi, 1792) (Anthicinae, Endomiini), né di *Anthicus sellatus* (Panzer, 1796) (Anthicinae, Anthicini) come era stato sinora ritenuto. La sinonimia non è stata stabilita poiché la serie tipica di Bonelli è andata distrutta, e non è per ora opportuno designare un neotipo.

Biscaccianti A. B. - Nuovi dati geonemici su alcuni Cerambicidi italiani (Coleoptera, Cerambycidae)...p.49

Vengono forniti dati faunistici inediti su 12 specie di Cerambycidae di varie regioni italiane e di altre 6 ne vengono confermate alcune vecchie segnalazioni; per ogni taxon sono riportati i dati completi di cattura e viene inoltre indicata la categoria corologica di appartenenza, la distribuzione attualmente nota in Italia e una nota di commento. Per *Leioderes kollari* viene segnalata una nuova pianta ospite. In base a questi reperti vengono confermate le segnalazioni di *Corymbia rubra* per la Valle d'Aosta, il Lazio e la Sardegna, di *Pedostrangalia pubescens* per il Piemonte, di *Xylotrechus rusticus* per l'Alto Adige, di *Alosterna tabacicolor* e *Judolia sexmaculata* per il Veneto e di *Stromatium unicolor* per la Campania e risultano invece nuove *Leioderes kollari* per il Piemonte, *Cortodera femorata*, *Pedostrangalia pubescens* e *Anastrangalia reyi* per il Veneto, *Axinopalpis gracilis*, *Monochamus galloprovincialis galloprovincialis* e *Oberea erythrocephala* per le Marche, *Cortodera holosericea* per il Lazio, *Pachytodes erraticus* per la Campania, *Ropalopus varini* e *Isotomus barbarae* per la Basilicata ed infine *Pogonocherus ovatus* per la Calabria.

Recensioni...p.63

Atti sociali...p.71