

ISSN 0004 - 6000

BOLLETTINO DELL'ASSOCIAZIONE ROMANA DI ENTOMOLOGIA

VOL. LXI (2006) N. 1-4



A.R.D.E. Fondata da Omero Castellani nel 1945

VOL. LXI (2006)

Endemismi italiani – 49 F. Collepardo Coccia. *Italopodisma trapezoidalis* (La Greca, 1966) (Orthoptera, Catantopidae)...I-II
Cassola F. - Editoriale...p. II

Fabio Collepardo Coccia - Contributo alla conoscenza dei nomi vernacolari di insetti e di altri animali della Ciociaria (Lazio)...p. 1

Questo lavoro nasce con la speranza di conservare quel patrimonio di conoscenze naturalistiche che le popolazioni del basso Lazio, dedite all'agricoltura ed alla pastorizia, hanno accumulato nei secoli. La nomenclatura vernacolare della fauna risulta essere, come ben evidenziano alcuni vocaboli, il prodotto di una attenta osservazione naturalistica legata, per necessità, allo stretto contatto tra popolazioni rurali e natura.

Gianni Gobbi - Osservazioni preliminari sulla coleotterofauna xilofaga del biotopo boschivo di Lessini in Grecia (Coleoptera Buprestidae; Cerambycidae)...p. 13

Il bosco igrofilo relitto presso Lessini, in Etolia (Grecia NW) è uno degli ultimi ancora esistenti lungo le coste del Mediterraneo. Malgrado risulti protetto dalla Convenzione di Ramsar, in realtà questo biotopo necessita di interventi mirati urgenti per la sua effettiva conservazione. In questa nota vengono analizzati i primi dati sulla coleotterofauna xilofaga emersi dalle ricerche in corso e riguardanti le famiglie Buprestidae e Cerambycidae. Viene commentata la presenza in questo bosco di alcune specie particolarmente interessanti, come *Scintillatrix solieri*, *Prionus besicanus*, *Corymbia rufa*, *Purpuricenus globulicollis* e *Rosalia alpina*. Inoltre i dati vengono confrontati con quelli disponibili sul bosco igrofilo di Policoro (S-Italia, prov.Matera) per evidenziare e commentare analogie e differenze.

Guido Pedroni - Catalogo annotato delle specie di *Dichotrachelus* e *Tropiphorus* della collezione Fiori presente a Bologna con descrizione di *Tropiphorus fiorii* n. sp. (Coleoptera, Curculionidae)... p. 21

Nella parte della collezione di Andrea Fiori conservata a Bologna si trovano 39 esemplari di 12 specie del genere *Dichotrachelus* Stierlin, 1853 e 43 esemplari di 11 specie del genere *Tropiphorus* Schoenherr, 1842. Una di esse, *Tropiphorus fiorii* n. sp., probabilmente endemica dell'Appennino toscano-emiliano ed affine a *T. bertolinii* Stierlin, 1894 è descritta nel presente lavoro.

Fernanda Cianficconi, Piero Salerno e Francesco Tucciarelli - Elenco faunistico dei Tricotteri del massiccio del Monte Subasio (Umbria, Perugia) (Trichoptera)...p. 29

Viene presentato il primo elenco faunistico dei Tricotteri di ambienti lotici del M. Subasio. Le ricerche sono state condotte tra il 1968 e il 1996, da 10 ricercatori in 54 biotopi, ubicati nel versante orientale ed occidentale, ad altitudini comprese tra 320 e 1016 m s.l.m.. I biotopi studiati comprendono habitat igropetrici, sorgenti naturali e catturate in manufatti, rivoli sorgivi e un torrente (T. Chiona). Solo 23 stazioni (19 nel versante orientale, 4 in quello occidentale) sono risultate abitate dai Tricotteri. 31 biotopi (21 nel versante occidentale, 10 in quello orientale) sottoposti a periodi di secca, a polluzioni o modificati dall'uomo (puliture periodiche dei substrati, catture per acquedotti), non hanno presentato popolamenti tricotterologici. In 147 campionamenti

sono state determinate 30 specie e 4 sottospecie, ascrivibili a 24 generi e 13 famiglie. La coesistenza di habitat diversificati ha favorito la presenza di specie di diversa valenza ecologica e appartenenti a varie categorie corologiche. *Plectrocnemia geniculata* ssp. potrebbe costituire una sottospecie nuova ed endemica dell'Appennino centrale.

Manuela Pinzari, Mario Pinzari e Alberto Zilli - Nuovi dati sui Tortricidi italiani (Lepidoptera, Tortricidae)...p. 53

Nel lavoro vengono elencate e commentate le novità faunistiche di Lepidotteri Tortricidi frutto delle pluriennali ricerche degli autori e di numerosi colleghi, tra cui il compianto Carlo Prola. In particolare sono segnalate per la prima volta in Italia *Phitheochroa reisseri* (Razowski, 1970) e *Cydia conicolana* (Heylaerts, 1874), la fauna dell'Italia centrale si arricchisce complessivamente di trenta specie e quella del meridione di due specie; vengono inoltre riportati i reperti relativi ad ulteriori 134 specie finora non note per singole regioni amministrative.

Recensioni...p. 103

Atti sociali...p. 105